HPFX

Nullstellen – Ableitungen – Integrale – Tabellen und Graphiken für transzendente Funktionen

**Eine bebilderte Dokumentation
für den PLUS42**

(Version 2, Juni 2024)

INHALTSVERZEICHNIS

- 0** Tipps und Tricks für HP-Taschenrechner
- 1** Ableitungsfreie Nullstellenverfahren
 - 1.1** Die 1-Punkt-Verfahren $(x_0 ; f(x_0))$ nach Kasturiarachi und Ostrowski
 - 1.2** Die 2-Punkte-Verfahren $(x_0, f(x_0)) ; (x_1, f(x_1))$
 - Das KANWAR-SHARMA-MAMTA-Verfahren
 - Die Verfahrensklasse:
Illinois – Pegasus – Andersen-Björck
 - Das Dekker-Verfahren
 - Das Ridders-Verfahren
 - 1.3** Die 3-Punkte-Verfahren
 - Inverse quadratische Interpolation
 - Die Sharma Familie
- 2** Numerische Integration einer reellen Funktion
 - Tabelle: Gauß49-Kronrod99-Quadraturformel
- 3** Numerische Differentiation reeller Funktionen
 - Über die Konstruktion der Gleichungssysteme zur Berechnung der Gewichte rechts- und linksseitiger, sowie zentraler Ableitungen
 - Tabelle der Gewichte der rechts- und linksseitigen Ableitungen für $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$ und $f^{(4)}(x)$

- **Tabelle der Gewichte der rechts- und linksseitigen Ableitungen für $f^{(5)}(x)$, $f^{(6)}(x)$, $f^{(7)}(x)$ und $f^{(8)}(x)$**
- **Gewichte für die zentrale Ableitung bis $f^{(10)}(x)$**
- **Höhere rechts- und linksseitige Ableitungen mit bis zu 10 Stützstellen**
- **Gewichte rechts- und linksseitiger Ableitungen für $f^{(4)}(x)$ bis $f^{(10)}(x)$**
- **Symbolische Differentiation (HP-Prime APP)**
- **Symbolische Differentiation (MS Mathematics)**

4 Plotten: Das “interessante“ Intervall

5 Bebilderte Kurzanleitung der HPFX-Funktionen

- **Initialisierung HPReg-Matrix**
- **Formeln und Funktionen des Programms HPFX**
- **Funktion $f(x)$ als EQN oder als Programm PRGM**
- **Globale Parameter**
- **Integration INTEG**
- **Nullstellenverfahren SOLVE**
- **Graphiken TABLE - PLOT - PHASE**
- **Ableitungen DERIV**
 - **mit dem HP-PRIME**
 - **mit der Microsoft Mathematics Applikation**
(Achtung: Fehler bei logarithmischen Ableitungen)

0 Tipps und Tricks für HP-Taschenrechner

Schon in den HP-65 MATH-PACs 1 und Math-PACs2 wurden die hier dokumentierten Formeln zur Berechnung elementarer Funktionen verwendet. Für die Taschenrechnerprogrammierung sind sie an Praktikabilität nicht zu überbieten und finden weiterhin Verwendung.

Elementare komplexe Funktionen $z = x + iy ; w = u + iv ; x, y, u, v \in \mathbb{R}$	
$\sqrt{z} = \sqrt{x + iy} = \sqrt{\frac{ x+iy +x}{2}} + i \frac{y}{2\sqrt{\frac{ x+iy +x}{2}}}$	
$\sqrt[3]{x} = \mathit{sign}(x)\sqrt[3]{ x } , \text{ reelle Kubikwurzel für } x \in \mathbb{R}$	
$\mathit{atan2} \left(\frac{y}{x} \right) = \begin{cases} \mathit{atan}(y/x), & x > 0 \\ \mathbf{0} \text{ (undefiniert)}, & x = 0 ; y = 0 \\ + \pi/2, & x = 0 ; y > 0 \\ - \pi/2, & x = 0 ; y < 0 \\ \mathit{atan}(y/x) + \pi, & x < 0 ; y \geq 0 \\ \mathit{atan}(y/x) - \pi, & x < 0 ; y < 0 \end{cases}$	HP-Code: $\rightarrow \text{POL} \quad \text{X} \langle \text{Y}$ $\text{FS? } 42 \quad 0.9$ $\text{FC? } 42 \quad 1 \quad \times$ $\text{FC? } 43 \quad \rightarrow \text{RAD}$
$z \cdot w = (x + iy)(u + iv) = x \cdot u - y \cdot v + i(x \cdot v + y \cdot u)$	
$\frac{z}{w} = \frac{(x+iy)}{(u+iv)} = \frac{x \cdot u + y \cdot v}{u^2 + v^2} + i \frac{u \cdot y - x \cdot v}{u^2 + v^2}$	
$\ln(z) = \ln r + i \theta = \ln \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right) + i \mathit{atan2} \left(\frac{y}{x} \right)$	
$\log_z(w) = \frac{\ln(w)}{\ln(z)}$	
$z^w = e^{w \ln(z)}$	
$z^{1/w} = e^{\ln(z)/w}$	
$e^z = e^{(x+iy)} = (\cos(y) + i \sin(y)) e^x$	
$e^{iz} = e^{(-y+ix)} = (\cos(x) + i \sin(x)) e^{-y}$	
$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$	

Komplexe (und reelle) trigonometrische und hyperbolische Funktionen und Umkehrfunktionen

$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$	$\operatorname{asin}(z) = -i \ln(iz + \sqrt{1 - z^2})$
$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$	$\operatorname{acos}(z) = -i \ln(z + i\sqrt{1 - z^2})$
$\tan(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i(e^{iz} + e^{-iz})}$	$\operatorname{atan}(z) = \frac{1}{2i} \ln\left(\frac{1+iz}{1-iz}\right)$
$\sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$	$\operatorname{asinh}(z) = \ln(z + \sqrt{z^2 + 1})$
$\cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$	$\operatorname{acosh}(z) = \ln(z + \sqrt{z^2 - 1})$
$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$	$\operatorname{atanh}(z) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$
$\cot[h](z) = \frac{1}{\tan[h](z)}$	$\operatorname{acot}[h](z) = \operatorname{atan}[h]\left(\frac{1}{x}\right)$
$\sec[h](z) = \frac{1}{\cos[h](z)}$	$\operatorname{asec}[h](z) = \operatorname{acos}[h]\left(\frac{1}{z}\right)$
$\csc[h](z) = \frac{1}{\sin[h](z)}$	$\operatorname{acsc}[h](z) = \operatorname{asin}[h]\left(\frac{1}{z}\right)$

Differentiationsregeln $u = u(x)$, $v = v(x)$, $\alpha \in \mathbb{R}$

Name	Funktion	1. Ableitung
Faktorregel	$\alpha \cdot u$	$\alpha \cdot u'$
Summenregel	$u + v$	$u' + v'$
Produktregel	$u \cdot v$	$v \cdot u' + u \cdot v'$
Quotientenregel	$\frac{u}{v} = u(v)^{-1}$	$(v \cdot u' - u \cdot v') \cdot (v)^{-2}$
Kettenregel	$u(v)$	$u'(v) \cdot v'$
logarithmisch	u^v	$(v' \cdot \ln(u) + v u'(u)^{-1}) u^v$

1. Ableitung elementarer reeller Funktionen

ACHTUNG: ^ bedeutet Konstante im Exponent
und ↑ bedeutet Funktion im Exponent

$f(x)$	Code	$f'(x)$	Code
const		0	0
x	#	1	1
x^n	$(\#)^{(n)}$	nx^{n-1}	$(n*\#)^{(n-1)}$
$\sqrt{x} = (x)^{(0,5)}$		$0.5 x^{-0.5}$	$0.5*(\#)^{(-0.5)}$
$\sqrt[n]{x} = (x)^{\left(\frac{1}{n}\right)}$			
EXP(x)	exp	EXP(x)	exp
LN(x)	ln	x^{-1}	$\#^{(-1)}$
LOG(x)	log	$(x LN(10))^{-1}$	$(\#*n(10))^{(-1)}$
SIN(x)	sin	COS(x)	cos
COS(x)	cos	$-SIN(x)$	-sin
TAN(x)	tan	$1 + TAN^2(x)$	$1+tan*tan$
ASIN(x)	asn	$(1 - x^2)^{-0,5}$	$(1-\#^{(2)})^{(-0.5)}$
ACOS(x)	acs	$-(1 - x^2)^{-0,5}$	$-(1-\#^{(2)})^{(-0.5)}$
ATAN(x)	atn	$(1 + x^2)^{-1}$	$(1+\#^{(2)})^{(-1)}$
SINH(x)	snh	COSH(x)	csch
COSH(x)	csch	SINH(x)	snh
TANH(x)	tnh	$1 - TANH^2(x)$	$1-tanh*tanh$
ASINH(x)	ash	$(1 + x^2)^{-0,5}$	$(1+\#^{(2)})^{(-0.5)}$
ACOSH(x)	ach	$(-1 + x^2)^{-0,5}$	$(\#^{(2)}-1)^{(-0.5)}$
ATANH(x)	ath	$(1 - x^2)^{-1}$	$(1-\#^{(2)})^{(-1)}$

Unberücksichtigte 1. Ableitungen von Funktionen

$f(x)$	<i>Code</i>	$f'(x)$	<i>Code</i>
$COT(x)$	-	$-1(SIN^2(x))^{-1}$	-
$ACOT(x)$	-	$-(1+x^2)^{-1}$	-
$COTH(x)$	-	$1-COTH^2(x)$	-
$ACOTH(x)$	-	$-(x^2-1)^{-1}$	-
$SEC(x)$	-	$SEC(x) \cdot TAN(x)$	-
$ASEC(x)$	-	$\frac{1}{\sqrt{x^2} \cdot \sqrt{x^2-1}}$	-
$SECH(x)$	-	$-SECH(x) \cdot TANH(x)$	-
$ASECH(x)$	-	$\frac{-1}{x \cdot \sqrt{-x^2+1}}$	-
$CSC(x)$	-	$-CSC(x) \cdot COT(x)$	-
$ACSC(x)$	-	$\frac{-1}{\sqrt{x^2} \cdot \sqrt{x^2-1}}$	-
$CSCH(x)$	-	$-CSCH(x) \cdot COTH(x)$	-
$ACSCH(x)$	-	$\frac{-1}{\sqrt{x^2} \cdot \sqrt{x^2+1}}$	-

Äquivalente Darstellung unberücksichtigter Funktionen

unberücksichtigte Funktion	äquivalente Darstellung
$COT[H](x)$	$\frac{1}{TAN[H](x)}$
$SEC[H](x)$	$\frac{1}{COS[H](x)}$
$CSC[H](x)$	$\frac{1}{SINN[H](x)}$
$ACOT[H](x)$	$ATAN[H]\left(\frac{1}{x}\right)$
$ASEC[H](x)$	$ACOS[H]\left(\frac{1}{x}\right)$
$ACSC[H](x)$	$ASIN[H]\left(\frac{1}{x}\right)$

1 Ableitungsfreie Nullstellenverfahren

Das wohl bekannteste Nullstellenverfahren für reelle Funktionen ist das Newton-Verfahren. Ist die Ableitungsfunktion bekannt, oder wie bei Polynomen leicht zu berechnen, ist das Newton-Verfahren bei einem geeignetem Startwert ein sehr gutes Verfahren. Nur ist die numerische Berechnung der ersten Ableitung alleinig aus den Funktionswerten an der Stelle x und in der Nähe bei $x + h$ für konstantes h bei transzendenten Funktionen nicht immer genau genug und kann zu erheblichen Fehlern führen. Die Wahl von h muss also "dynamisch" erfolgen. In Abhängigkeit des Arguments x und des Funktionswertes $f(x)$ kann ein konstantes h zu groß, aber auch zu klein sein. Dennoch erfolgt der prinzipielle Ansatz über das Newton-Verfahren:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Nun wird die erste Ableitung $f'(x_n)$ rechtsseitig angenähert durch:

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n+f(x_n)) - f(x_n)}{f(x_n)}$$

um das nach Steffensen benannte Verfahren:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f^2(x_n)}{f(x_n+f(x_n)) - f(x_n)}$$

zu erhalten.

Dabei wird zunächst $h = 0,1 + 0,01x$ gesetzt und für den Fall, dass $|f(x)| < h$ ist, der betragsmäßig kleinere Wert für h gewählt. Natürlich kann auch eine linksseitige Annäherung an die erste Ableitung erfolgen. Das Programm **HPFX** berechnet rechts- wie linksseitige, aber auch zentrale Ableitungen.

ACHTUNG: Prinzipiell ist bei jedem Nullstellenverfahren eine Obergrenze an Iterationen festzulegen, deren Überschreitung gleichbedeutend ist mit: **Nicht Konvergent!**

1.1 Die 1-Punkt-Verfahren $(x_0 ; f(x_0))$ nach Kasturiarachi und Ostrowski

Abweichend von der Verfahrensvorschrift in der Originalliteratur, finden hier zentrale Ableitungen Verwendung. Dies ist wegen der Anzahl der Funktionsauswertungen zwar aufwendiger, durch eine bessere Approximation der Ableitung aber deutlich genauer.

$$h = 0,1 + 0,01x$$

$$f_0 = f(x_0)$$

$$\text{IF } |f_0| < h$$

$$h = f_0$$

$$f'_0 = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} \approx f'(x_0)$$

$$x_0^* = x_0 - \frac{f_0}{f'_0} = x_0 - \frac{2hf_0}{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}$$

Kasturiarachi Iterationsschritt:

$$x_{1,K} = x_0 - \frac{f_0^2}{f'_0[f_0 - f(x_0^*)]} = x_0 - (x_0 - x_0^*) \frac{f_0}{f_0 - f(x_0^*)}$$

Ostrowski Iterationsschritt:

$$x_{1,O} = x_0 - \left(\frac{f_0}{f'_0}\right) \frac{f(x_0^*) - f_0}{2f(x_0^*) - f_0} = x_0 - (x_0 - x_0^*) \frac{f(x_0^*) - f_0}{2f(x_0^*) - f_0}$$

- Kasturiarachi: Leap frogging Newton's method;
Int. J. Math. Educ. Sci. Technol. 33 (4) (2002) 521–527
- Jain; Steffensen type methods for solving non-linear equations;
Applied Mathematics and Computation 194 (2007) 527–533
- Cordero: Steffensen type methods for solving nonlinear equations;
Journal of Computational and Applied Mathematics 236 (2012) 3058–3064

1.2 Die 2-Punkte-Verfahren $(x_0, f(x_0)) ; (x_1, f(x_1))$

Das KANWAR-SHARMA-MAMTA-Verfahren

Dieses hybride Verfahren beruht auf dem Sekantenverfahren, das auf eine Parabel übertragen wird. Der Vorteil liegt in der Wahl des Parameters α um sowohl das Sekantenverfahren, als auch das von Kanwar-Sharma-Mamta entwickelte Verfahren zu erhalten. Durch das Radizieren kann mit dem KSM-Verfahren auch eine Näherung an eine komplexe Nullstelle ermittelt werden.

$$f_0 = f(x_0)$$

$$f_1 = f(x_1)$$

$$\mathbf{IF} \quad |f_1| > |f_0|$$

$$x_0 \Leftrightarrow x_1$$

$$f_0 \Leftrightarrow f_1$$

$$f_{1-0} = f_1 - f_0$$

$$\alpha = \begin{cases} 0 & ; \text{Sekantenverfahren} \\ 0,25 & ; \text{KSM - Verfahren} \end{cases}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{2(x_1 - x_0)f_1}{f_{1-0} + \mathit{sign}(f_{1-0})\sqrt{(f_{1-0})^2 + 4\alpha(x_1 - x_0)^2}}$$

- Kanwar, Sharma, Mamta: A new family of Secant-like method with super-linear convergence
App. Math. and Comp. 171 (2005) 104–107
- Mamta, Kanwar, Kukreja, Singh: On a class of quadratically convergent iteration formulae;
App. Math. and Comp. 166 (2005) 633–637

Die Verfahrensklasse:

Illinois – Pegasus – Andersen-Björck

Diese Verfahren sind dann geeignet und mit Sicherheit konvergent, wenn $f(x_0)f(x_1) \leq 0$ gilt. Konvergenz kann aber auch dann eintreten, wenn die Voraussetzung nicht erfüllt ist.

$$s = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$x_2 = x_0 - \frac{f(x_0)}{s}$$

IF $f(x_2) f(x_1) < 0$

$$x_0 = x_1$$

$$f(x_0) = f(x_1)$$

$$x_1 = x_2$$

$$f(x_1) = f(x_2)$$

ELSE $\{ f(x_2) f(x_1) > 0 \}$

• Illinois: $m = 0,5$

• Pegasus: $m = \frac{f(x_0)}{f(x_0) + f(x_1)}$

• Andersen-Björck: $m = \begin{cases} 1 - \frac{f(x_1)}{f(x_0)}, & \text{wenn } > 0 \\ 0,5 & , \text{sonst} \end{cases}$

$$f(x_0) = mf(x_1)$$

$$x_1 = x_2$$

$$f(x_1) = f(x_2)$$

Das Dekker-Verfahren

Damit das Dekker-Verfahren sicher konvergiert, bedarf es zweier Startwerte x_0 und x_1 deren Funktionswerte $f(x_0)$ und $f(x_1)$ verschiedene Vorzeichen besitzen. Zu Beginn der Iteration werden die Startwerte x_0 und x_1 derart geordnet, dass $f(x_1)$ dichter an Null liegt. Es gelte also: $|f(x_1)| < |f(x_0)|$.

IF $|f(x_1)| > |f(x_0)|$

$$x_0 \Leftrightarrow x_1$$

$$f(x_0) \Leftrightarrow f(x_1)$$

$$s = x_1 - \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)} f(x_1)$$

$$x_2 = \frac{x_1 + x_0}{2}$$

IF $s \in [x_1 ; x_2]$

$$x_2 = s$$

IF $f(x_0) f(x_2) > 0$

$$x_0 = x_2$$

$$f(x_0) = f(x_2)$$

ELSE $\{ f(x_0) f(x_2) < 0 \}$

$$x_1 = x_2$$

$$f(x_1) = f(x_2)$$

- Brent: An Algorithmus with guaranteed convergence for finding a zero of a function,
Comput. J. 14, 422–425

Das Ridders-Verfahren

Auch das Ridders-Verfahren benötigt zur sicheren Konvergenz ein Startintervall $[x_0; x_2]$ dessen Funktionswerte $f(x_0)$ und $f(x_2)$ unterschiedliche Vorzeichen besitzen. Dabei sei $f(x_0) > 0$.

$$x_1 = \frac{x_0 + x_2}{2}$$

$$x_3 = x_1 + (x_1 - x_0) \frac{\text{sign}(f(x_0)) f(x_1)}{\sqrt{f^2(x_1) - f(x_0) f(x_2)}}$$

IF $f(x_3) > 0$

$$x_2 = x_3$$

$$f(x_2) = f(x_3)$$

IF $f(x_0) f(x_1) > 0$

$$x_0 = x_1$$

$$f(x_0) = f(x_1)$$

ELSE $\{f(x_3) < 0\}$

$$x_0 = x_3$$

$$f(x_0) = f(x_3)$$

IF $f(x_1) f(x_2) > 0$

$$x_2 = x_1$$

$$f(x_2) = f(x_1)$$

Anmerkung: Besitzen $f(x_0)$ und $f(x_2)$ das gleiche Vorzeichen, so kann mit: $x_3 = x_1 + (x_1 - x_0) \frac{-\text{sign}(f(x_0)f(x_2))\text{sign}(f(x_0)) f(x_1)}{\sqrt{f^2(x_1) - f(x_0) f(x_2)}}$ eine Näherung berechnet werden, die den vom Betrag her größeren Funktionswert und das Argument ersetzt.

- Ridders: A New Algorithm for Computing a Single Root of a Real Continuous Function,
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS, VOL. CAS-26, NO. II, NOVEMBER 1979

1.3 Die 3-Punkte-Verfahren

Um die Iteration eines 3-Punkte-Verfahren zu starten, bedarf es dreier Startwerte. Wenn das nicht gegeben ist und nur ein Startwert x_1 vorliegt, können durch Addition oder Subtraktion einer geeigneten Größe h die fehlenden Punkte erzeugt werden. Alternativ kann auch mit einem 1-Punkt-Verfahren begonnen und über den dadurch ermittelten zweiten Punkt durch ein 2-Punkt-Verfahren der benötigte dritte Startwert erzeugt werden.

Inverse quadratische Interpolation

Im Gegensatz zu anderen quadratischen Interpolations-Verfahren, wird bei der IQI, der inversen quadratischen Interpolation, durch den Verzicht auf das Radizieren stets der Weg durch das Komplexe vermieden. Zu Beginn der Iteration werden die x_i derart sortiert, dass gilt:

$$f(x_2) \leq f(x_1) \leq f(x_0).$$

Bezeichne: $f_i = f(x_i)$, so ist:

$$x_3 = \frac{f_1 f_2}{(f_0 - f_1)(f_0 - f_2)} x_0 + \frac{f_0 f_2}{(f_1 - f_0)(f_1 - f_2)} x_1 + \frac{f_0 f_1}{(f_2 - f_0)(f_2 - f_1)} x_2$$

$$x_0 = x_1$$

$$f(x_0) = f(x_1)$$

$$x_1 = x_2$$

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$x_2 = x_3$$

$$f(x_2) = f(x_3)$$

Die Sharma Familie

Die Sharma-Familie beruht auf der quadratischen Interpolation dreier Stützstellen x_i und ihrer Funktionswerte $y_i = f(x_i)$. Ausgehend von dem quadratischen Interpolationspolynom:

$$Q(x; y) = a(x - x_i)^2 + b(y - y_i)^2 + c(x - x_i) + d(y - y_i) + e = 0$$

erhält man aus den Stützstellen: $(x_2; y_2); (x_1; y_1); (x_0; y_0)$

die Koeffizienten von $Q(x; y)$. Bezeichne im Folgenden:

$$h_1 = x_2 - x_1$$

$$h_2 = x_2 - x_0$$

$$\delta_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\delta_2 = \frac{y_2 - y_0}{x_2 - x_0}$$

Aus den Koeffizienten:

$$c = \frac{a(h_1\delta_2 - h_2\delta_1) + b\delta_1\delta_2(h_1\delta_1 - h_2\delta_2)}{\delta_2 - \delta_1}$$

$$d = \frac{a(h_2 - h_1) + b(h_2\delta_2^2 - h_1\delta_1^2)}{\delta_2 - \delta_1}$$

Wahl der Koeffizienten a und b . Es gilt stets: $e = 0$									
a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1	1	0	1	1	0	1	2	1	-1
Kreis		Parabel		Muller		Ellipse		Hyperbel	

Anmerkung zum Muller-Verfahren: wenn $\left| \frac{y_3}{y_2} \right| > 10$ dann setze $x_3 = \frac{x_3 + x_2}{2}$

Erhält man die Näherung:

$$x_3 = x_2 - \frac{2y_2(by_2 - d)}{c + \text{sign}(c)\sqrt{c^2 + 4ady_2}}$$

- Müller: A Method for Solving Algebraic Equations using an Automatic Computer; Mathematical Tables and other Aids to Computation, No. 10, (1956), 208-215)
- Sharma: A Family of Methods for solving nonlinear Equation using Quadratic Interpolation; Computers and Mathematics with Applications 48 (2004) 709-714

2 Numerische Integration einer reellen Funktion

Um den Wert eines bestimmten Integrals zu berechnen, dessen Stammfunktion nicht bekannt, bzw. nur schwer zu ermitteln ist, haben sich die Gauß-Quadraturformeln bewährt. Die Stützstellen und Gewichte werden für das Intervall $[-1 ; 1]$ berechnet und wie schon in den MATH-PACs für den HP-65 praktiziert, auf das Intervall $[a ; b]$ transformiert.

Gauß-Legendre Knoten und Gewichte (HP 65)	
Knoten x_i	Gewichte w_i
-0,9324695142	0,1713249424
-0,6612093865	0,360761573
-0,2386191861	0,4679139346
0,2386191861	0,4679139346
0,6612093865	0,360761573
0,9324695142	0,1713249424

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n w_i f\left(\frac{(b-a)x_i+a+b}{2}\right)$$

$$\int_a^\infty f(x) dx \approx 2 \sum_{i=1}^n \frac{w_i}{(1+x_i)^2} f\left(a + \frac{2}{1+x_i} - 1\right)$$

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx \approx 2 \sum_{i=1}^n \frac{w_i}{(1+x_i)^2} f\left(a - \frac{2}{1+x_i} + 1\right)$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty f(x) dx &\approx \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^\infty f(x) dx \\ &\approx 2 \sum_{i=1}^n \frac{w_i}{(1+x_i)^2} \left[f\left(1 - \frac{2}{1+x_i}\right) + f\left(\frac{2}{1+x_i} - 1\right) \right] \end{aligned}$$

Das Programm **HPOLY** verwendet die Quadraturformeln von Gauß-Kronrod. Der Vorteil liegt in der Einbettung der Stützstellen und Gewichte der Gauß-Formeln in die Kronrod-Formeln.

Die n -ten Stützstellen und die n -ten Gewichte der Gauß-Formel sind die $2n$ -ten Stützstellen und die $2n$ -ten Gewichte der Gauß-Kronrod-Formel.

Dadurch erhält man ohne Mehraufwand eine Abschätzung des Quadraturfehlers $err \approx |K99 - G49|$.

Es gilt demnach:

$$\int_a^b f(x) dx \cong K99 \pm err = K99 \pm |K99 - G49|$$

Die Berechnung der Stützstellen und Gewichte **G49K99** wurde mit:

<https://keisan.casio.com/exec/system/1289382036>

durchgeführt. Diese Internetseite war nach Mitte 2023 nicht mehr aufrufbar.

Als numerische Näherung an das tatsächliche Integral wird der Wert **K99** als exakt angenommen und der Fehler abgeschätzt durch $\epsilon \approx |K99 - G49|$. Es gilt demnach:

$$\int_a^b f(x) dx \cong K99 \pm \epsilon = K99 \pm |K99 - G49|$$

Das Programm **HPFX** verwendet die folgende mit dem obigen Programm ermittelte Tabelle zur Berechnung der Integrale.

Tabelle: Gauß49-Kronrod99-Quadraturformel

i	Gauß-Kronrod Knoten x_i	Kronrod Gewichte w_i	Gauß-Gewichte w_i
1	-999804199685638727994974003607983	0.00052747696837833231426392216677	0
2	-998820150606635379361831272704111	0.00147796392817436202085567581223501	0.003027278988922905077480698175827
3	-9968198142998264694012839590360078	0.00252187657314964968451363314444	0
4	-9937886619441677907601138592579536	0.0035329557014832599891867695315599	0.007035099590086451473450678311348
5	-989764238414064471063168293135	0.0045141331625998620836358420641829	0
6	-9847578959142130043592989953685747	0.0055014203993380782040404696584139	0.0110205510315935804975082881668333
7	-9787573030312066845298589027301962	0.006499872532166484516849830171239	0
8	-9717622009015553801399724215047741	0.0074869102764140445198175459913945	0.0149621449356246510295843191202015
9	-9637900181363554282611096000219869	0.008455185639775045670114558371764	0
10	-95485365867413723355243679668184	0.0094175722296862066762316928503638	0.0188435958530894584444506533911073
11	-944955059221329473155835112992641	0.0103787329241166077069683569328913	0
12	-934100294755810149058982460636545	0.0113278438578780228794689725519478	0.0226492015874466764987709642160429
13	-9223054754539361687554290102229532	0.0122591748799473589076504729170825	0
14	-9095856558280732852130196403558001	0.0131792068212079366056557559621176	0.026363618927066016960945745239742
15	-8959496245835934207352332018243469	0.014091111047270544037748385218045	0
16	-8814084455730089100370315358170049	0.0149880989346802956592971874255513	0.0299718846205838253506905580741472
17	-865980004315145726442523756091547	0.015865723698872893130368150761464	0
18	-8496821198441657010348818722429793	0.016727898553773186823128361860891	0.0334594667916221743424871508916892
19	-8325285014874601685172633163696317	0.0175768726412448262384462318590166	0
20	-814534427359855431539500787764777	0.0184077538519825820281183776609503	0.0368123209630006898194672366988823
21	-7957203207625248381360568099163764	0.0192169329826556442116763155896852	0
22	-776106894345446635018142812248456	0.0200070643859274929265393916944815	0.0400169457663730213686050367431033
23	-7557118903695143082456546843790014	0.0207798535198561693336617663172753	0
24	-734554254237402696213674212858525	0.0215314818077816867538181700504126	0.0430604369812595979883454840010385
25	-712657066705008830847420587154317	0.0222589139301299466359937854028854	0
26	-6900438244251321135047518072749419	0.0229641216311680166298032506167028	0.04593053935559585354249961997212767
27	-666735700841571667866116467842425	0.023648494373863135027606738151061	0
28	-6427548324192376640568569485839001	0.0243089029298119497086904956086293	0.0486156958878282402776511972878685
29	-618126817800879299161146713068752	0.0249427312116380137806008849854078	0
30	-5928776941089007124558643367926285	0.025551567629898396796236813110352	0.0511050943301445906746228060493186
31	-567031549495391732863107815442941	0.026136629572717056199681859247504	0
32	-540613246991726066558225467229436	0.026695273107158037742721370750002	0.0533887107082589685279429337301762
33	-513650628401734382311100884324782	0.0272252058087967119960015977339419	0
34	-4861719414524920421769760960585751	0.0277278075508688728381337851641494	0.05545734967480358869043158148269807
35	-4582036915390298548495608644613814	0.028204220570029200521357749544287	0
36	-429772993341576524658584141807423	0.02865216671090199984955207682324	0.0573026815301874754851645923508165
37	-4009095739292798809373223889102203	0.0290696140121504756930876722916518	0
38	-371643501262284888863734540946961	0.0294578454056420734075586763875507	0.0589172757600272660245276507424925
39	-3420031959918559601078363738324531	0.0298179973237107521896477020354547	0
40	-3120175321197487622078606765064163	0.030148081066799933145430671257942	0.0602946309531520173031061168755416
41	-2817177082410294178774691465638328	0.0304462797396858877385633903866	0
42	-2511351786125772735071559428246113	0.0307138558577390833919631228468087	0.06142920097919293629682664614030107
43	-2202997655098053353242633730358589	0.030951992615566392527522287324914	0
44	-1892415924618135864853101738599865	0.031158937496597415869647162792595	0.0623164173200572674010768252159497
45	-1579928776643683586660036556130289	0.0313330525912310597588614425068009	0
46	-1265859972696720510679852885755362	0.0314756358269989035185166465702536	0.06295270746519569947439955578289101
47	-095051649986123375660035089328368	0.0315879594586859731614238500111578	0
48	-06342068498268678602883482087848497	0.0316684660566117158446164077085652	0.0633355092964917485908369274000905
49	-0317258634590731536308193652686307	0.031715664503973344041013897230302	0
50	0	0.0317309313985218944090527052437375	0.0634632814047905977182534678795296
51	0.0317258634590731536308193652686307	0.0317156645039733440410138972303019	0
52	0.063420684982686786028834820878485	0.0316684660566117158446164077085652	0.06333550929649174859083692740009052
53	0.095051649986123375660035089328368	0.031587959458685973161423850011158	0
54	0.1265859972696720510679852885755362	0.0314756358269989035185166465702536	0.06295270746519569947439955578289101
55	0.157992877664368358666003655613029	0.031333052591231059758861442506801	0
56	0.1892415924618135864853101738599865	0.031158937496597415869647162792595	0.0623164173200572674010768252159497
57	0.220299765509805335324263373035859	0.0309519926155663925275222873249136	0

58	0.2511351786125772735071559428246113	0.0307138558577390833919631228468087	0.06142920097919293629682664614030107
59	0.2817177082410294178774691465638328	0.0304462797396858877385633903866002	0
60	0.312017532119748762207860676506416	0.030148081066799933145430671257942	0.06029463095315201730310611687554159
61	0.3420031959918559601078363738324531	0.029817997323710752189647702035455	0
62	0.3716435012622848888637345409469605	0.0294578454056420734075586763875507	0.05891727576002726602452765074249252
63	0.4009095739292798809373223889102203	0.029069614012150475693087672291652	0
64	0.429772993341576524658584141807423	0.02865216671090199984955207682324	0.05730268153018747548516459235081654
65	0.4582036915390298548495608644613814	0.0282042205700292005213577495442871	0
66	0.4861719414524920421769760960585751	0.0277278075508688728381337851641494	0.05545734967480358869043158148269807
67	0.5136506284017343823111008843247821	0.0272252058087967119960015977339419	0
68	0.5406132469917260665582254672294359	0.026695273107158037742721370750002	0.05338871070825896852794293373017621
69	0.5670315494953917328631078154429413	0.0261366295727170561996818592475035	0
70	0.5928776941089007124558643367926285	0.025551567629898396796236813110352	0.05110509433014459067462280604931856
71	0.6181268178008792991611467130687517	0.0249427312116380137806008849854078	0
72	0.6427548324192376640568569485839	0.024308902929811949708690495608629	0.04861569588782824027765119728786853
73	0.6667357008415716678661164678424251	0.023648494373863135027606738151061	0
74	0.690043824425132113504751807274942	0.0229641216311680166298032506167028	0.04593053935559585354249961997212767
75	0.7126570667050088308474205871543169	0.022258913930129946635993785402885	0
76	0.7345542542374026962136742128585249	0.0215314818077816867538181700504126	0.0430604369812595979883454840010385
77	0.7557118903695143082456546843790014	0.020779853519856169333661766317275	0
78	0.7761068943454466350181428122484561	0.0200070643859274929265393916944815	0.04001694576637302136860503674310332
79	0.7957203207625248381360568099163764	0.0192169329826556442116763155896852	0
80	0.814534427359855431539500787764777	0.0184077538519825820281183776609503	0.0368123209630006898194672366988823
81	0.832528501487460168517263316369632	0.0175768726412448262384462318590166	0
82	0.8496821198441657010348818722429793	0.01672789855377318682312836186089	0.0334594667916221743424871508916892
83	0.8659800043151457264442523756091547	0.015865723698872893130368150761464	0
84	0.8814084455730089100370315358170049	0.014988098934680295659297187425551	0.0299718846205838253506905580741472
85	0.8959496245835934207352332018243469	0.0140911110472705440377483852180448	0
86	0.9095856558280732852130196403558001	0.013179206821207936605655755962118	0.026363618927066016960945745239742
87	0.922305475453936168755429010222953	0.0122591748799473589076504729170825	0
88	0.934100294755810149058982460636545	0.0113278438578780228794689725519478	0.0226492015874466764987709642160429
89	0.9449550592213294731558351129926407	0.010378732924116607706968356932891	0
90	0.9548536586741372335552436796681844	0.0094175722296862066762316928503638	0.0188435958530894584444506533911073
91	0.9637900181363554282611096000219869	0.0084551856397750456701145583717636	0
92	0.971762200901555380139972421504774	0.00748691027641404451981754599139445	0.0149621449356246510295843191202015
93	0.9787573030312066845298589027301962	0.0064998725321664845168498301712395	0
94	0.9847578959142130043592989953685747	0.0055014203993380782040404696584139	0.0110205510315935804975082881668333
95	0.9897642384140644710631682931350003	0.0045141331625998620836358420641829	0
96	0.993788661944167790760113859257954	0.0035329557014832599891867695315599	0.007035099590086451473450678311348
97	0.9968198142998264694012839590360078	0.0025218765731496496845136331444401	0
98	0.99882015060663579361831272704111	0.001477963928174362020855675812235	0.003027278988922905077480698175827
99	0.9998041996856387279949740036079827	0.00052747696837833231426392216677	0

- Laurie: CALCULATION OF GAUSS-KRONROD QUADRATURE RULES, MATHEMATICS OF COMP., Volume 66, Number 219, July 1997, Pages 1133–1145
- Calvetti: COMPUTATION OF GAUSS-KRONROD QUADRATURE RULES, MATHEMATICS OF COMPUTATION, Volume 69, Number 231, Pages 1035–1052 (2000)
- Notaris: GAUSS-KRONROD QUADRATURE FORMULAE, Electronic Transactions on Numerical Analysis, Volume 45, pp. 371–404, 2016, Kent State University.

3 Numerische Differentiation reeller Funktionen

Die Berechnung der Ableitungen ist erheblich komplizierter als die Berechnung der Integrale. Ist die abzuleitende Funktion nicht "glatt" genug, können die numerischen Resultate ungenau werden. Zweckmäßigerweise werden zur numerischen Berechnung der n -ten Ableitung von $f^{(n)}(x)$ die rechtsseitige Näherung $f_r^{(n)}(x)$, und/oder die linksseitige Näherung $f_l^{(n)}(x)$ bestimmt. Beide Näherungen sollten sehr dicht beieinander liegen. Die links- und rechtsseitigen Näherungen lassen sich durch die Gewichte $w_{i,r}^{(n)}$ bzw. $w_{i,l}^{(n)}$ und ein kleines, aber nicht zu kleines, geeignetes h berechnen. Es gilt:

$$f_r^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^k} \sum_{i=0}^k w_{i,r}^{(n)} f(x + ih) \text{ und}$$

$$f_l^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^k} \sum_{i=0}^k w_{i,l}^{(n)} f(x - ih)$$

Sofern beide Annäherungen existieren, lässt sich die numerische Näherung verbessern, wenn der Mittelwert aus den links- und rechtsseitigen Ableitungen

$$f^{(n)}(x) \approx f_{r,l}^{(n)}(x) = \frac{f_r^{(n)}(x) + f_l^{(n)}(x)}{2} \text{ gewählt wird.}$$

Für die Gewichte gilt:

$$w_{i,l}^{(n)} = \begin{cases} w_{i,r}^{(n)}, & \text{falls } n \text{ gerade} \\ -w_{i,r}^{(n)}, & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Eine Herleitung der Formeln und die Berechnung der Gewichte findet man unter:

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_difference_coefficient

Über die Konstruktion der Gleichungssysteme zur Berechnung der Gewichte rechts- und linksseitiger, sowie zentraler Ableitungen

Es seien für die Funktion $f(x)$ die Funktionswerte an allen Stützstellen $(x \pm ih)$ $i = -n, \dots, 0, \dots, n$, bekannt, dann können die Ableitungen bis zum **2n-ten** Grad berechnet werden. Für die Berechnung der **n-ten** Ableitung werden der Funktionswert $f(x)$ und mindestens **n** weitere Stützstellen benötigt.

Die Matrix A zur Berechnung der Gewichte besitzt die Struktur:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ -\mathbf{n} & \leftrightarrow & -\mathbf{3} & -\mathbf{2} & -\mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \leftrightarrow & \mathbf{n} \\ (-\mathbf{n})^2 & \leftrightarrow & \mathbf{9} & \mathbf{4} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{4} & \mathbf{9} & \leftrightarrow & (\mathbf{n})^2 \\ (-\mathbf{n})^3 & \leftrightarrow & -\mathbf{27} & -\mathbf{8} & -\mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{8} & \mathbf{27} & \leftrightarrow & (\mathbf{n})^3 \\ \downarrow & \downarrow \\ (-\mathbf{n})^n & \leftrightarrow & (-\mathbf{3})^n & (-\mathbf{2})^n & (-\mathbf{1})^n & \mathbf{0} & \mathbf{1} & (\mathbf{n})^n & (\mathbf{3})^n & \leftrightarrow & (\mathbf{n})^n \end{pmatrix}$$

Für eine links- bzw. rechtsseitige Ableitung wird die Untermatrix

$$A_l = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ -\mathbf{n} & \leftrightarrow & -\mathbf{3} & -\mathbf{2} & -\mathbf{1} & \mathbf{0} \\ (-\mathbf{n})^2 & \leftrightarrow & \mathbf{9} & \mathbf{4} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ (-\mathbf{n})^3 & \leftrightarrow & -\mathbf{27} & -\mathbf{8} & -\mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ (-\mathbf{n})^n & \leftrightarrow & (-\mathbf{3})^n & (-\mathbf{2})^n & (-\mathbf{1})^n & \mathbf{0} \end{pmatrix} \text{ bzw.}$$

$$A_r = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \leftrightarrow & \mathbf{n} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{4} & \mathbf{9} & \leftrightarrow & (\mathbf{n})^2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{8} & \mathbf{27} & \leftrightarrow & (\mathbf{n})^3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & (\mathbf{n})^n & (\mathbf{3})^n & \leftrightarrow & (\mathbf{n})^n \end{pmatrix} \text{ gewählt.}$$

Unabhängig von der Wahl der auch gleitenden (Unter-)Matrix A gilt stets: A ist invertierbar und das Gleichungssystem lösbar.

Die Gleichungssysteme für links- und rechtsseitige Gewichte sind:

$$A_l \begin{pmatrix} w_{-n} \\ \downarrow \\ w_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \downarrow \\ m! \\ \uparrow \\ 0 \end{pmatrix} \text{ für die linksseitige } m\text{-te Ableitung } f_l^{(m)}(x)$$

$$A_r \begin{pmatrix} w_0 \\ \downarrow \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \downarrow \\ m! \\ \uparrow \\ 0 \end{pmatrix} \text{ für die rechtsseitige } m\text{-te Ableitung } f_r^{(m)}(x)$$

$$A \begin{pmatrix} w_{-n} \\ \downarrow \\ w_0 \\ \downarrow \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \downarrow \\ m! \\ \uparrow \\ 0 \end{pmatrix} \text{ für die zentrale } m\text{-te Ableitung } f^{(m)}(x)$$

Hinweis: Für die m -te Ableitung steht $m!$ an $(m+1)$ -ter Stelle.

BEISPIEL: Gewichte für die 3. Ableitung mit 5 Stützstellen

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -4 & -3 & -2 & -1 & 0 \\ 16 & 9 & 4 & 1 & 0 \\ -64 & -27 & -8 & -1 & 0 \\ 256 & 81 & 16 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_{-4} \\ w_{-3} \\ w_{-2} \\ w_{-1} \\ w_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} w_{-4} \\ w_{-3} \\ w_{-2} \\ w_{-1} \\ w_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -4 & -3 & -2 & -1 & 0 \\ 16 & 9 & 4 & 1 & 0 \\ -64 & -27 & -8 & -1 & 0 \\ 256 & 81 & 16 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5 \\ -7 \\ 12 \\ -9 \\ 2,5 \end{pmatrix}$$

Dieses Ergebnis findet sich als

3	4	2	0	0	0	0	3	-14	24	-18	5
---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	-----	---

 in der

Tabelle der Gewichte der rechts- und linksseitigen Ableitungen für $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$ und $f^{(4)}(x)$

$f^{(n)}(x)$	i	DIV	W ₋₈	W ₋₇	W ₋₆	W ₋₅	W ₋₄	W ₋₃	W ₋₂	W ₋₁	W ₀
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	8	840	105	-960	3920	-9408	14700	-15680	11760	-6720	2283
1	7	840	0	-120	980	-3528	7350	-9800	8820	-5880	2178
1	6	60	0	0	10	-72	225	-400	450	-360	147
1	5	60	0	0	0	-12	75	-200	300	-300	137
1	4	12	0	0	0	0	3	-16	36	-48	25
1	3	6	0	0	0	0	0	-2	9	-18	11
1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	-4	3
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	1
2	8	5040	3267	-29664	120008	-284256	435330	-448672	312984	-138528	29531
2	7	180	0	-126	1019	-3618	7380	-9490	7911	-4014	938
2	6	180	0	0	137	-972	2970	-5080	5265	-3132	812
2	5	12	0	0	0	-10	61	-156	214	-154	45
2	4	12	0	0	0	0	11	-56	114	-104	35
2	3	1	0	0	0	0	0	-1	4	-5	2
2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	-2	1
3	8	240	469	-4216	16830	-39128	58280	-57384	36706	-13960	2403
3	7	120	0	-232	1849	-6432	12725	-15560	11787	-5104	967
3	6	8	0	0	15	-104	307	-496	461	-232	49
3	5	4	0	0	0	-7	41	-98	118	-71	17
3	4	2	0	0	0	0	3	-14	24	-18	5
3	3	1	0	0	0	0	0	-1	3	-3	1
4	8	240	967	-8576	33636	-76352	109930	-102912	61156	-21056	3207
4	7	6	0	-21	164	-555	1056	-1219	852	-333	56
4	6	6	0	0	17	-114	321	-484	411	-186	35
4	5	1	0	0	0	-2	11	-24	26	-14	3
4	4	1	0	0	0	0	1	-4	6	-4	1

- Fornberg: Generation of Finite Difference Formulason Arbitrarily Spaced Grids, MATHEMATICS OF COMPUTATION VOLUME 51, NUMBER 184 OCTOBER 1988

Mit Hilfe des Programms: <https://matrixcalc.org/de/> wurde berechnet:

Tabelle der Gewichte der rechts- und linksseitigen Ableitungen für $f^{(5)}(x)$, $f^{(6)}(x)$, $f^{(7)}(x)$ und $f^{(8)}(x)$

$f^{(n)}(x)$	i	DIV	W ₋₈	W ₋₇	W ₋₆	W ₋₅	W ₋₄	W ₋₃	W ₋₂	W ₋₁	W ₀
5	8	6	35	-305	1170	-2581	3580	-3195	1790	-575	81
5	7	6	0	-25	190	-621	1130	-1235	810	-295	46
5	6	2	0	0	5	-32	85	-120	95	-40	7
5	5	1	0	0	0	-1	5	-10	10	-5	1
6	8	4	23	-196	732	-1564	2090	-1788	956	-292	39
6	7	1	0	-3	22	-69	120	-125	78	-27	4
6	6	1	0	0	1	-6	15	-20	15	-6	1
7	8	2	7	-58	210	-434	560	-462	238	-70	9
7	7	1	0	-1	7	-21	35	-35	21	-7	1
8	8	1	1	-8	28	-56	70	-56	28	-8	1

Um die Genauigkeit der Gewichte exakt zu bestimmen, muss in Ganzzahlarithmetik mit echten Brüchen gerechnet werden. Arithmetik in Dezimalzahldarstellung führt zu Rundungsfehlern. Dadurch scheiden iterative Verfahren, die sich schrittweise an die tatsächliche Lösung (der Gewichte) nähern, aus. Die Gewichte müssen durch ein "direktes" Verfahren berechnet werden.

Es gilt: Je glatter die Funktion, desto mehr Stützstellen können gewählt werden. Das Finden eines geeigneten Wertes für h kann nur durch jeweiliges Ausprobieren erfolgen, da ein zu großes h bei vielen Stützstellen eine zu große Umgebung darstellt. Ist h zu klein gewählt, gibt es Auslöschungs- und Rundungsfehler. Eine symbolische Differentiation ist und bleibt das Maß aller Dinge.

Um Ableitungen höheren Grades als 8 gesichert zu berechnen, sollte auf zentrale Gewichtung zurückgegriffen werden. Dadurch sind die Elemente der zu invertierenden Matrix vom Betrag her kleiner, als bei nur links- oder rechtsseitigen Berechnungen und die Berechnung kann in Brucharithmetik erfolgen.

Gewichte für die zentrale Ableitung bis $f^{(10)}(x)$

$f^{(n)}(x)$	i	DIV	VZ	w_{-8}	w_{-7}	w_{-6}	w_{-5}	w_{-4}	w_{-3}	w_{-2}	w_{-1}	w_0
10	17	2016	id	-67	1324	-12408	72548	-289268	820428	-1698760	2611876	-3011346
9	17	5040	ch	134	-2317	18612	-90685	289268	-615321	849380	-652969	0
10	13	12	id	0	0	-5	72	-450	1640	-3915	6480	-7644
9	13	4	ch	0	0	1	-12	60	-164	261	-216	0
8	13	360	id	0	0	31	-492	3606	-15100	39825	-69912	84084
7	13	480	ch	0	0	-31	410	-2404	7550	-13275	11652	0
10	11	1	id	0	0	0	1	-10	45	-120	210	-252
9	11	2	ch	0	0	0	-1	8	-27	48	-42	0
8	11	3	id	0	0	0	-1	13	-69	204	-378	462
7	11	24	ch	0	0	0	5	-52	207	-408	378	0
6	11	240	id	0	0	0	13	-190	1305	-4680	9690	-12276
5	11	288	ch	0	0	0	-13	152	-783	1872	-1938	0
4	11	15120	id	0	0	0	-82	1261	-9738	52428	-140196	192654
3	11	30240	ch	0	0	0	205	-2522	14607	-52428	70098	0
2	11	25200	id	0	0	0	8	-125	1000	-6000	42000	-73766
1	11	12600	ch	0	0	0	-10	125	-750	3000	-10500	0
8	9	1	id	0	0	0	0	1	-8	28	56	70
7	9	2	ch	0	0	0	0	-1	6	-14	14	0
6	9	4	id	0	0	0	0	-1	12	-52	116	-150
5	9	6	ch	0	0	0	0	1	-9	26	-29	0
4	9	240	id	0	0	0	0	7	-96	676	-1952	2730
3	9	240	ch	0	0	0	0	-7	72	-338	488	0
2	9	5040	id	0	0	0	0	-9	128	-1008	8064	-14350
1	9	840	ch	0	0	0	0	3	-32	168	-672	0

Bedeutung von VZ: $\boxed{\text{VZ} = \text{id}}$ bedeutet, dass die Vorzeichen von w_i und w_{-i} identisch und bei $\boxed{\text{VZ} = \text{ch}}$ verschieden sind.

Höhere rechts- und linksseitige Ableitungen mit bis zu 10 Stützstellen

Online Applikationen zur Matrizenrechnung findet man hier:

<https://matrixcalc.org/de/>

<https://matrix.reshish.com/de/>

Eine gute Einführung in das Thema "Berechnung der Gewichte" findet man bei:

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_difference_coefficient

<https://web.media.mit.edu/~crtaylor/calculator.html>

Mit diesen Programmen konnte folgende Tabelle erstellt werden.

Gewichte rechts- und linksseitiger Ableitungen für $f^{(4)}(x)$ bis $f^{(10)}(x)$.

$f^{(n)}(x)$	i	DIV	W-10	W-9	W-8	W-7	W-6	W-5	W-4	W-3	W-2	W-1	W ₀
9	9	1	0	-1	9	-36	84	-126	126	-84	36	-9	1
8	9	1	0	-40	370	-1520	3640	-5600	5740	-3920	1720	-440	50
7	9	12	0	-91	861	-3624	8904	-14070	14826	-10416	4704	-1239	145
6	9	4	0	-36	347	-1492	3756	-6100	6626	-4812	2252	-616	75
5	9	144	0	-1069	10461	-45804	117876	-196638	220614	-166476	81444	-23421	3013
4	9	240	0	-1068	10579	-47024	123348	-210920	244498	-192624	99604	-460020	4275
10	10	1	1	-10	45	-120	210	-252	210	-120	45	-10	1
9	10	2	9	-92	423	-1152	2058	-2520	2142	-1248	477	-108	11
8	10	3	29	-302	1416	-3936	7182	-8988	7812	-4656	1821	-422	44
7	10	24	315	-3332	15897	-45048	83958	-107520	95802	-58632	23583	-5628	605
6	10	240	3013	-32290	156405	-451080	858090	-1125276	1030290	-650280	270705	-67090	7513

Bei den grün unterlegten Zeilen sind die Vorzeichen von w_i und w_{-i} verschieden. Bei weißen Zeilen sind sie identisch.

Anmerkung: Die Tabellen in diesem Dokument enthalten nur ein Teil der verwendeten Daten des Programms HPFX. Das Programm berechnet "nur" bis zur 8. Ableitung, verwendet aber optional auch die jeweils minimale Anzahl an Stützstellen.

Symbolische Differentiation (mit der HP-Prime APP)

Mit der herunterladbaren und für Windows kostenlosen App

<https://www.hp-prime.de/de/category/15-software>

kann eine EQN behelfsweise symbolisch differenziert werden.

Mit **Print**, **Copy**, **Fix** und **STRG "C"** wird die EQN kopiert und

mit: , , $\frac{\partial}{\partial}$, $\frac{\partial}{\partial x}$, **STRG "V"** in die Anzeige des HP-PRIME

eingefügt. Durch wird die symbolische Ableitung gemäß den Differentiationsregeln:

Differentiationsregeln für EQN		
$f = f(x), u = u(x), v = v(x), \alpha \in \mathbb{R}$		
Name	Funktion	1. Ableitung
Faktorregel	$\alpha \cdot u$	$\alpha \cdot u'$
Summenregel	$u + v$	$u' + v'$
Produktregel	$u \cdot v$	$v \cdot u' + u \cdot v'$
Quotientenregel	$\frac{u}{v} = u(v)^{-1}$	$(v \cdot u' - u \cdot v') \cdot (v)^{-2}$
Kettenregel	$u(v)$	$u'(v) \cdot v'$
logarithmisch	u^v	$(v' \cdot \ln(u) + v u'(u)^{-1}) u^v$

auf die in einer EQN verwendeten Funktionengruppen:

+ - * /

SQRT EXP LOG LN (A)SIN(H) (A)COS(H) (A)TAN(H)

ausgeführt.

4 Plotten: Das “interessante“ Intervall

Zur Vorgabe der Intervallgrenze wird angenommen, dass die Funktion, oder EQN in Zusammenhang mit einer Winkelfunktion steht. Deshalb ist als Intervallgrenze $I = [0, 2\pi]$ vorgegeben. Dabei kann die Funktion EVAL bei einer EQN zu einem Fehler führen, die zu einem sofortigen Programmende führt. Bei jedem Wiederaufruf von HPFX wird dann das Intervall I solange verkleinert, bis der zu dem Fehler führende Wert (hoffentlich) nicht mehr im Intervall I enthalten ist. Bei einer Beendigung des Programms mit **EXIT** wird der Fehlermarker gelöscht.

Um einen Funktionsplot im Display vernünftig darzustellen, muss zur Orientierung die X-Y-Achse im Display erscheinen. Deshalb sollte für die PLOT-Funktion das Intervall der X-Achse $[x_- ; x_+]$ links von der Null beginnt und rechts von der Null endet.

Um für die Y-Achse ein Intervall vorzugeben, werden zu allen Argumenten x_i die Funktionswerte $f(x_i)$ berechnet. Das Intervall $[Y_- ; Y_+]$ mit $Y_- = \min(0 ; f(x_i))$ und $Y_+ = \max(0 ; f(x_i))$ legt dann den druckbaren Bereich fest. In einer Umgebung von Polstellen kann es vom Betrag her zu sehr großen Intervallgrenzen kommen. Nach einer Anpassung der Minimal- und Maximalwerte sollte dann etwa 80% der Kurve im druckbaren Bereich erscheinen und die zu großen, sowie die zu kleinen Werte am oberen, bzw. unteren Displayrand ausgegeben werden.

HINWEIS: Um den Grenzfall des leeren Intervalls $I = [0 ; 0]$ auszuschließen, sollten die jeweiligen unteren Intervallgrenzen mindestens um den Wert eines Pixels nach links und die oberen Intervallgrenzen um den Wert eines Pixels nach rechts verschoben werden. Zusätzlich kann dann für ein Intervall die betragsmäßig kleinere Intervallgrenze gegen einen definierten Bruchteil der betragsmäßig größeren Intervallgrenze geprüft und optional dadurch ersetzt werden.

5 Bebilderte Kurzanleitung der HPFX-Funktionen

Aktion	Handbuch
<p>MENU-Taste "EXIT" drücken</p>
<p>"SHIFT" und "EXIT" drücken</p>

FEHLER BEIM PROGRAMMAUFRUF

Wenn nach dem Aufruf von **HPFX** nicht der "Startbildschirm", sondern ein beliebig anderer "Bildschirm", oder eine "Fehlermeldung" erscheint, dann sollte ein erneuter Aufruf von **HPFX** erfolgreich sein und den "Startbildschirm" anzeigen. Ist das nicht der Fall, dann sollten in der Datei "**HPReg**" die Einträge "1:1" und "1:4" auf " " (blank) gesetzt werden.

Bleibt auch das erfolglos, hilft auf jeden Fall "CLV HPReg" **CLV** **HPReg** und ein erneuter Aufruf des Programms **HPFX**.

FEHLER IN DER PROGRAMMAUSFÜHRUNG

Bei einer EQN kann die Funktion EVAL zu einem Überlauf führen und damit das Programm **HPFX** beenden. Bei jedem erneuten Wiederaufruf von **HPFX** wird das vorgegebene Intervall der EQN stets verkleinert.

Initialisierung der HPReg-Matrix

```

< HOME >
-----
T: 0,0000
Z: 0,0000
Y: 0,0000
X: 0,0000
XEQ
HPFX

```

Oder wenn das Programm **HPFX**
der Taste **foo** zugewiesen ist:

```

R/S glob. Param. R/S
-----
T: 0,0000
Z: 0,0000
Y: 0,0000
X: 0,0000
EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT

```

Existiert bisher keine **HPReg**-Datei,
dann wird sie mit **EXIT** angelegt.

Formeln und Funktionen des Programms HPFX

```

R/S glob. Param. R/S
-----
T: 0,0000
Z: 0,0000
Y: 0,0000
X: 0,0000
EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT

```

```

Plus42 Print-Out
=====
HPFX
=====
INTEG: Gauss49-Kronrod99
DERIV: 8←...1← 0 →1...→8
SOLVE:
    Automatik
    Kasturiarachi (Xo;fo)
    Ostrowski (Xo;fo)
    Kanwar-Sharma-Mamta
    (Xo;fo), (X1;f1)
    Regula-Falsi-Type
    (Xi;Yi) i=0,1
    min|Yi|
    Sekante
    Illinois
    Pegasus
    Andersen-Björck
    Dekker
    Ridder
    Inv. Quad. Interp.
    (Xi;Yi) i=0,1,2
    Sharma-Family
    (Xi;Yi) i=0,1,2
    min|Yi|
    Kreis
    Parabel
    Muller
    Ellipse
    Hyperbel
f(X) als Equation EQN
VAR X = # x X z Z
CONST: PI π e E
Klammern: ( ) [ ] <>
Funktionen:
+ - * x / ÷ ** ABS ||
SQR SQ Q SQRT √ W
√tnt √'n' Wtnt W'n'
LOG LOG↓n↓ LOG_n_
LD LB LN EXP E** E↑ E^
(A)SIN(H) (A)COS(H)
(A)TAN(H) (A)COT(H)
(A)SEC(H) (A)CSC(H)
f(X) als externes PRGM
LBL "{name}"
RCL "XF"
:
(opt.) STO "F0"
RTN END
=====

```

HPFX: Equation EQN oder Programm PRGM

R/S glob. Param. R/S

T: 0,0000
Z: 0,0000
Y: 0,0000
X: 0,0000

EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT

EQN or ext. PRGM?

T: 0,0000
Z: 0,0000
Y: 0,0000
X: 0,0000

EQN ADGL PRGM

Use SKIN: HP-41EQN or:
Write Equation direct

1/(1-COS(#)+0,25)
ABCDE FGHI JKLM NOPQ RSTUV WXYZ

R/S

R/S glob. Param. R/S

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0

EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT

ACHTUNG: Eine mehr als 44 Zeichen lange EQN wird extern geschrieben und mit STRG "C" und STRG "V" in das X-Register des PLUS42 kopiert.

Ein problemloser Fehlerhinweis auf EQNcheck wird angezeigt durch:

Err. EQNcheck = ...

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0

M E N U

Die Programmfortsetzung kann auch durch R/S erfolgen.

Ein PARSE Fehler führt zu:

Error in EQN ()

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: "1+SIN((#))"

Ein EVAL Fehler führt zu:

Nonexistent
1+▶SINU(#)

T: 1
Z: 1 i1
Y: 1
X: "SINU"

Bei PARSE- und EVAL Fehlern führt zweifaches R/S zurück zum Menu.

HPFX: Equation. SKIN: HP-41EQN

Use SKIN: HP-41EQN or
Write Equation direct

$$1/(1-\cos(X)+0.25)$$

ABCDE FGHI JKLM NOPQ RSTUV WXYZ

Selektiere SKIN HP-41EQN

**NEW
EQN**

Equation = ?

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: ""

Die Eingabe der Funktion erfolgt **NUR** über den **Taschenrechner** und **NIE** über die **Tastatur** des Laptops.

{ HOME }

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: ".../(1-COS(X)+0.25)"

PRINT EQN

STO #EQN

Equation #EQN saved
Change SKIN & R/S

T: ".../(1-COS(X)+0.25)"
Z: 1
Y: 0
X: "1/(1-COS(X)+0.25)"

HPFX: Equation EQN oder Programm PRGM

$$f(x) = e^{-x}x^{0,8}$$

PRP "PGM-1"

```

Plus42 Print-Out
PRP "PGM-1"
00 ( 25-Byte Prgm )
01 LBL "PGM-1"
RCL "XF" +/- E↑X
RCL "XF" 0,8 Y↑X ×
END
    
```

INPUT: PRGM-NAME R/S
Length L: 1 ≤ L ≤ 6

ABCDE FGHI JKLM NOPQ RSTUV WXYZ

{ HOME }

PGM-1_

ABCDE FGHI JKLM NOPQ RSTUV WXYZ

R/S

R/S glob. Param. R/S

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0

EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT

R/S glob. Param. R/S

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0

PGM- INTEG SOLVE DERIV Print EXIT

EQN or ext. PRGM?

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0

EQN ADGL PRGM

PRV "HPReg"

```

Plus42 Print-Out
HPReg= [ 1x46 Matrix ]
1:1= "EQN"
1:2= "EQN"
1:3= "1/(1-COS(#)+0,25)"
1:4= "PGM-1"
    
```

HINWEIS: Aus WORD können Formeln in HPFX eingefügt werden.

Bis zu 44 Zeichen können in das ALPHA-Register kopiert werden. Längere Strings können in das X-Register kopiert werden, dürfen aber nicht mit einem Vorzeichen, oder einer Zahl beginnen. Abhilfe schafft zum Beispiel das Einfügen eines „=" an den Anfang des Ursprungstext. Das Gleichheitszeichen „=" wird durch HPFX eliminiert.

Ist die einzugebende Funktion eine gewöhnliche Differentialgleichung, kann mit **ADGL** in das Programm HPDGL gewechselt werden.

HPFX: globale Parameter

```
R/S glob. Param. R/S

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0
EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT
```

R/S

```
0 #IT |Ydiff| |Xdiff|

T: 0
Z: 99
Y: 0.0000000001
X: 0.0000000001
#IT Xdiff Ydiff PRT0 h=E-4 BACK
```

Globale Parameter

#IT Anzahl der Iterationen

Xdiff $\leq |x_i - x_{i-1}|$ dann x_i akzept.

Ydiff $\leq |Y_i|$ dann x_i akzeptieren

PRT0 nur Ergebnisse drucken

PRT- keine Druckausgabe

PRT+ drucke jeden Iterationsschritt

h=E-4 Abstand h in $x \pm h$ zur Berechnung der Ableitungen

HPFX: Integration

INTEG

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1-\cos(x)+0,25} = \frac{2\pi}{0,75} \quad (\text{RAD-Modus})$$

```
R/S glob. Param. R/S

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0
EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT
```

```
a/b f(x)dx = F(b)-F(a)
INPUT: ■a ■b

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0
EQN ■J■ ■J↑ ↓J■ ↓J↑ BACK
```


HPFX: Nullstellenverfahren: $f(x) = x^{2,5} - 2\sqrt{x}$

SOLVE

```
R/S glob. Param. R/S

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0

EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT
```

```
1+2+3 Punkt-Verfahren

T: "|"
Z: "X2"
Y: "X1"
X: "X0"

EQN Auto PARA SEQ BACK
```

```
EQN or ext. PRGM?

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0

EQN ADGL PRGM
```

```
_ #IT |Ydiff| |Xdiff|

T: "Auto"
Z: 99
Y: 0.00000000001
X: 0.00000000001

#IT Xdiff Ydiff PRT0 h=E-4 BACK
```

$$f(x) = x^{2,5} - 2\sqrt{x}$$

```
Use SKIN: HP-41EQN or:
Write Equation direct

(X)^(2.5)-2*J(X)
ABCDE FGHI JKLM NOPQ RSTUV WXYZ
```

R/S

```
R/S glob. Param. R/S

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0

EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT
```

- ### Die Parameter:
- #IT** Anzahl der Iterationen
 - Xdiff** $\leq |x_i - x_{i-1}|$ dann x_i akzept
 - Ydiff** $\leq |Y_i|$ dann x_i akzeptieren
 - PRT0** nur Ergebnisse drucken
 - PRT-** keine Druckausgabe
 - PRT+** drucke jeden Iterationsschritt
 - h=E-4** Abstand h in $x \pm h$ zur Berechnung der Ableitungen

```
Y:
X:

#IT Xdiff Ydiff PRT+ h=E-4 BACK
```

1+2+3 Punkt-Verfahren

T: "|"
Z: "X2"
Y: "X1"
X: "X0"

EQN **Auto** **PARA** **REQ** **BACK**

1 Punkt-Verfahren

T: "|"
Z: "|"
Y: "|"
X: "X0"

EQN **Kast** **PARA** **REQ** **BACK**

Nullstelle X approx.
#CNT dX f(X) X

T: 3
Z: 3.08819724928E-4
Y: -4.95453047978E-11
X: 1.41421356236

SHOW **PRT** **Xn+1** **BACK**

X = 1,4142135623583651
41556400289988593

T: 3
Z: 3.08819724928E-4
Y: -4.95453047978E-11
X: 1.41421356236

SHOW **PRT** **Xn+1** **BACK**

Auswahl der/des Verfahren(s)

Auto automatische Verfahrenswahl

1-Punkt-Verfahren:

Kast Kasturiarachi

Ostr Ostrowski

2- Punkte-Verfahren:

KSHM Kanwar Sharma Mamta

RegFa Regula Falsi Varianten

minW Minimum der $|Y_i|$

Sekan Sekantenverfahren

ILLino Illinois

Pegas Pegasus

And.E Andersen-Björck

Dekke Dekker

Ridde Ridders

3-Punkte-Verfahren

invQ inverse quad. Interpolation

Shar Sharma-Familie

minW Minimum der $|Y_i|$

Kreis Kreisinterpolation

Parab parabolische Interp.

Mullr Muller-Verfahren

ELLip elliptische Interp.

Hypl hyperbolische Interp

extrn externes Verfahren

Druckparameter: $f(x) = x^{2,5} - 2\sqrt{x}$

```
R/S glob. Param. R/S

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0
EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT
```

```
3 Punkt-Verfahren

T: "|"
Z: "X2"
Y: "X1"
X: "X0"
EQN Shor minWl PARA XEQ BACK
```

```
_ #IT |Ydiff| |Xdifff|

T: "Sharma" PRT-
Z: 99 PRT0
Y: 0.0000000001
X: 0.0000000001
#IT Xdiff Ydiff PRT+ h=E-4 BACK
```

```
{ HOME }

T: "|"
Z: "|"
Y: "X0"
X: 5_
EQN Kost PARA XEQ BACK
```

```
Nullstelle X approx.
#CNT dX f(X) X

T: 5
Z: 3.84755248196E-10
Y: 9.5791E-29
X: 1.41421356237
SHOW PRT Xn+1 BACK
```

PRT- Nichts drucken

PRT0 Nur Ergebnisse drucken

PRT+ Jeden Schritt drucken

Nullstellen: externe mehrstufige Verfahren

SOLVE

Externes Verfahren: Jain

$$g(x_0) = f(x_0 + f(x_0)) - f(x_0)$$

$$x_0^* = x_0 - \frac{f^2(x_0)}{g(x_0)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f^3(x_0)}{[g(x_0)][f(x_0) - f(x_0^*)]}$$

PRP "JAIN"

```

Plus42 Print-Out
PRP "JAIN"
00 ( 107-Byte Prgm )
01 LBL "JAIN"
RCL "XF" RCL "F0" +
"Xext1" XEQ "HPFX"
RCL "XF" RCL "F0" X↑2
RCL "Yext1" RCL "F0" -
÷ - "Xext2"
XEQ "HPFX" RCL "Yext1"
RCL "F0" - RCL "F0"
RCL "Yext2" - × 1/X
RCL "F0" 3 Y↑X ×
RCL "XF" X<>Y - SF 25
RTN .END.
    
```

Programmvariablen:

$$XF = x_0$$

$$F0 = f(x_0)$$

$$Xext1 = x_0 + f(x_0)$$

$$Yext1 = f(x_0 + f(x_0))$$

$$Xext2 = x_0^*$$

$$Yext2 = f(x_0^*)$$

Argumente, Funktionswerte:

ALPHA = "Xext{m}" $m = 0:9$

nach XEQ "HPFX": "Yext{m}"

```

< HOME >
T: "X2"
Z: "X1"
Y: "X0"
X: 2
EQN extrn PARA XEQ BACK
    
```

```

externer PRGM-Name ?
JAIN_
ABCDE FGHI JKLM NOPQ RSTUV WXYZ
    
```

R/S

```

Nullstelle X approx.
#CNT dx f(X) X
T: 4
Z: -1.20486278869E-8
Y: 1.2835971971E-23
X: 1.41421356237
SHOW PRT Xn+1 BACK
    
```

```

Plus42 Print-Out
#METHOD= "extrn"
#CNT: i=4 JAIN
f(X) = 1.2835971971E-23
X = 1.41421356237
    
```

Jain; Steffensen type methods for solving non-linear equations; App. Math. and Comp. 194 (2007) 527–533

Startwerte: $x_i \in \mathbb{R}$, *oder* $\mathbb{C}$

- Ohne Startwert wird $x_0 = 1$ gesetzt.
- Ist x_1 nicht initialisiert, wird $x_1 = x_0 + 1$ gesetzt.
- Sind x_1 und x_2 nicht initialisiert,
- wird $x_1 = x_0 + 1$ und $x_2 = x_1 + 1$ gesetzt.
- Ist nur x_2 nicht initialisiert, wird $x_2 = 0,5(x_0 + x_1)$ gesetzt.
- Nach der Berechnung der Funktionswerte werden vor Iterationsbeginn die Startwerte den Beträgen ihrer Funktionswerte nach geordnet.

Parameter drucken

```

_ #IT |Ydiff| |Xdiffl
T: "Kastu"
z: 99
Y: 0.0000000001
x: 0.0000000001
#IT |Xdiffl |Ydiff| PRT+ h=E-4 BACK

```

einfache Nachiteration

```

Nullstelle: f(X) ~ 0
#CNT dX f(X) X
T: 3
z: 3.08819724928E-4
Y: -4.95453047978E-11
x: 1.41421356236
SHOW PRT Xn+1 BACK

```

n-fache Nachiterationen

```

Nullstelle: f(X) ~ 0
#CNT dX f(X) X
T: 3.08819724928E-4
z: -4.95453047978E-11
Y: 1.41421356236
x: Wert > 0 ganzzahlig
SHOW PRT Xn+1 BACK

```

HPFX: Graphiken

TABLE PLOT PHASE

$$f(x) = \frac{1}{1 - \cos(x) + 0,25}$$

R/S glob. Param. R/S

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0

EQN **INTEG** **SOLVE** **DERIV** **Print** **EXIT**

EQN: f(X) = 1/(1-COS(X)+0.25)

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0

EQN **←Prt** **TABLE** **CopyX** **PLOT** **BACK**

EQN: f(X) = 1/(1-COS(X)+0.25)

T: 0,0000
Z: 0,0000
Y: 0,0000
X: 0,0000

EQN **←Prt** **TABLE** **CopyX** **PLOT** **BACK**

Xinc Schrittweite

Xinc Anzahl der Schritte

--- Xinc Xmax Xmin

T: 0
Z: 5.38461538462E-1
Y: 6.5
X: -0.5

EQN **Xmin** **Xmax** **Xinc** **REC** **BACK**

Plus42 Print-Out

Tabelle: f(X)
f(X)="1/(1-COS(X)+0.25)"

X	f(X)	***
-0.5	2.68515890415	***
	3.84615384615E-2	***
	3.98820204017	***
	5.76923076923E-1	***
	2.4280384942	***
	1.11538461538	***
	1.23431204947	***
	1.65384615385	***
	7.50213215995E-1	***
	2.19230769231	***
	5.45772711806E-1	***
	2.73076923077	***
	4.61511703533E-1	***
	3.26923076923	***
	4.46057127596E-1	***
	3.80769230769	***
	0.49110178619	***
	4.34615384615	***
	6.21850795937E-1	***
	4.88461538462	***
	9.27107333686E-1	***
	5.42307692308	***
	1.67323502395	***
	5.96153846154	***
	3.31912844315	***
6.5	3.65747893695	***

TAB Xinc Xmax Xmin

T: [14x2 Matrix]
z: 5.38461538462E-1
Y: 6.5
X: -0.5

EQN **Xmin** **Xmax** **Xinc** **YEQ** **BACK**

EQN: $f(X) = 1/(1-\cos(X)+0.25)$

T: 0
z: 0
Y: 0
X: 0

EQN **←Prt** **TABLE** **Copy** **PLOT** **BACK**

Ymax Ymin Xmax Xmin

T: 4
z: -0.4
Y: 6.5
X: -0.5

Xmin **Xmax** **Ymin** **Ymax** **YEQ** **BACK**

PHASE **PAPER** **BACK**

PHASE **PAPER** **BACK**

```

.....,0... iY Pmax Pmin

T: 0.1
Z: 6.5
Y: 10
X: 0
Pmin Pmax |iY| <0.0> NEG BACK

```

```

.....,0... iY Pmax Pmin

T: 0.1
Z: 6.5
Y: 10
X: 0
Pmin Pmax |iY| <0.0> NEG BACK

```

```

Ymax Ymin Xmax Xmin

T: 4
Z: -0.4
Y: 6.5
X: -0.5
Xmin Xmax Ymin Ymax NEG BACK

```

Plus42 Print-Out

```

Xmin = -0,5000
Xmax = 6,5000
|iY| = 6,5000
Pmax = 10,0000
Pmin = 0,0000
mask <.....,0.....>

```

```

{ HOME }

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0
EQN ←Prt TABLE Copy# PLOT BACK

```

```

Copy & Paste to Phase:
Xmin Xmax +/- iY f(Z)

T: -0.5
Z: 6.5
Y: 0.5
X: "1/(1-COS(Z)+0.25)"
f(x) f(z) BACK

```

STRG "C"
WINDOWS: "phase.exe"
STRG "V"

ANDROID:
"Komplexe Funktionen"

```
Copy & Paste to Phase:
Xmin Xmax +/-iY f(Z)
T: -0.5
Z: 6.5
Y: 0.5
X: "1/(1-COS(Z)+0.25)"
R:f(X) R:f(Z) BACK
```

```
Length(f(X)) = 17
Length(f(Z)) = 17
T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0
EQN +Prt TABLE Copy PLOT BACK
```

HPFX: Ableitungen **DERIV**

$$\left(\frac{1}{1-\cos(x)+0,25}\right)' = -\frac{\sin(x)}{\left(\frac{5}{4}-\cos(x)\right)^2}$$

```
R/S glob. Param. R/S

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0
EQN INTEG SOLVE DERIV Print EXIT
```

Ist ein Funktionswert **X=?** für X eingegeben, dann erscheint **WST.X** im Menu. Steht **WST.X** im Menu, führt jede Parameteränderung zu einer Neuberechnung der zuvor gewählten Ableitung.

```
INPUT: X=?

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 0
f X=? ←X→ <1> h=E-4 BACK
```

```
h |err| f''(X) X

T: 0,0001
Z: 0,0003
Y: 1,7343
X: 5,0000
f'' WST.X ←X→ <2> h=E-4 BACK
```

```
{ HOME }

T: 0
Z: 0
Y: 0
X: 5
f' X=? ←X→ <1> h=E-4 BACK
```

```
h |err| f'(X) X

T: 0,0001
Z: 0,0001
Y: 1,0269
X: 5,0000
f' WST.X ←X→ <1> h=E-4 BACK
```

```
h |err| f'(X) X

T: 0.0001
Z: 0.67133126135E-5
Y: 1.02689577208
X: 5
f' WST.X ←X→ <1> h=E-4 BACK
```

errechnetes Ergebnis:
1,02689577207603764842...
 tatsächliches Ergebnis:
1,02689576668991686982...

HPFX: Ableitungen **DERIV**

Die Parameter

```
h | err | f'(X) | X
T: 0.0001
Z: 8.67133126135E-5
Y: 1.02689577208
X: 5
f' | M:ST.M | ←M→ | <1> | h=E-4 | BACK
```

f **<1>** ... **<8>** Berechnung des Funktionswertes.

f' **<1>** ... **<8>** Berechnung der 1. Ableitung.

f'' **<2>** ... **<8>** Berechnung der 2. Ableitung.

f''' **<3>** ... **<8>** Berechnung der 3. Ableitung.

f(4) **<4>** ... **<8>** Berechnung der 4. Ableitung.

f(5) **<5>** ... **<8>** Berechnung der 5. Ableitung.

f(6) **<6>** ... **<8>** Berechnung der 6. Ableitung.

f(7) **<7>** ... **<8>** Berechnung der 7. Ableitung.

f(8) **<8>** ... **<8>** Berechnung der 8. Ableitung

←M→ Mittelwert von rechts- und linksseitiger Ableitung ...

M→ Rechtsseitige Ableitung ...

←M Linksseitige Ableitung ...

... an **<m>** Stützstellen mit den äquidistanten Abständen **h=E-4**.

HP-PRIME: Symbolische Ableitungen

$$\left(\frac{1}{1 - \cos(x) + 0,25}\right)' = -\frac{\sin(x)}{(-\cos(x) + 0,25 + 1)^2}$$

STRG "C"

$$-\frac{\sin(z)}{(-\cos(z)+0.25+1)^2}$$

STRG „V“

Microsoft Mathematics: Symbolische Ableitungen

$$\left(\frac{1}{1 - \cos(x) + 0,25}\right)' = -\frac{\sin(x)}{(-\cos(x) + 1,25)^2}$$

STRG "C"

STRG "V"

STRG "V"